

Használati útmutató orvostechnikai eszközhöz

MEDISTUS DIRECT TOROKSPRAY 30 ml

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, mert fontos információkat tartalmaz az Ön számára a **MEDISTUS DIRECT TOROKSPRAY** alkalmazásával kapcsolatban. Tartsa meg a tájékoztatót, hogy szükség esetén újra el tudja olvasni.

Aktívösszetevő-tartalom 1 adagban (0,1 ml):

Hialuronsav 0,1 mg, izlandizuzmó-kivonat 0,05 mg, orosz ziliz gyökérkivonat 0,05 mg, Aloe vera levélkivonat 0,05 mg.

Egyéb összetevők:

Demineralizált víz, glicerin, málnaaroma, szukralóz, kálium-szorbát.

Kíszerelés:

Orvostechnikai eszköz spray (folyadékkal, és spray-adagolófejjel ellátva) 30 ml-es flakonban (300 adag).

Alkalmazási terület:

A **MEDISTUS DIRECT TOROKSPRAY** a következő esetekben kiegészítő kezelésként alkalmazható:

- a szájüreg és a torok bakteriális fertőzésének esetén;
- a fokozott -pl. orrdugulás miatti - szájlégzés okozta kellemetlenségek esetén;
- torokszárazság esetén;
- torokkaparás esetén;
- nyelés közben tapasztalt égő érzés esetén.

Felhasználási javallat:

A terméket felnőttek és 1 évesnél idősebb gyermekek, valamint várandós és szoptató nők is alkalmazhatják.

Ellenjavallatok és figyelmeztetések:

Ne használja a terméket, ha Ön túlérzékeny (allergiás) annak bármely összetevőjével szemben.

Kerülje a termék szembe kerülését. Ha bármilyen kellemetlen érzés jelentkezik, hagyja abba a használatát. Az orvostechnikai eszközzel kapcsolatos minden súlyos mellékhatást jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó vagy beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

Ne használja a lejáratú idő után.

Használati utasítás:

Az első használat előtt többször nyomja meg az adagolófejet, hogy megteljen folyadékkal. Helyezze az adagolófejet a szájába, és 1-2 adagot fújjon a torok irányába.

Ajánlott adagolás:

1-3 éves korú gyermekek: étkezés után napi 1-3 alkalommal 1-2 adag;

4-12 éves korú gyermekek: étkezés után napi 1-4 alkalommal 1-2 adag;

12 éves kor felett és felnőtteknek: étkezés után napi 3-6 alkalommal 2-6 adagot ajánlott alkalmazni.

Higiéniiai okokból és a kórokozók terjedésének megakadályozása érdekében egy flakont csak egy személy használjon. Az adagolófej végét minden használat után folyó víz alatt tisztítsa meg és törölje óvatosan szárazra.

Tárolás:

5°C–25°C közötti hőmérsékleten, az eredeti csomagolásban tárolandó.

Gyermekektől elzárva tartandó.

Ne használja, ha a csomagolás sérült.

Gyártó: GLOBAL PHARMA CM S.A.

ul. Berezów 49A,
26-130 Suchedniów

VitaPlus

Forgalmazó: VitaPlus Kft.

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.,
1. torony, 5. emelet

ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZ

A használati utasítás elkészítésének dátuma: 08/2023

A felhasznált szimbólumok magyarázata:

SZIMBÓLUM HASZNÁLAT/ JELENTÉS



Gyártási tételszám



Lejárati napja



CE – tanúsítja az európai uniós előírásoknak való megfelelést



Tárolási hőmérséklet-tartomány



Ne használja, ha a csomagolás sérült



Gyártó



Olvassa el a termékhez mellékelt használati utasítást!